

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA PROFISSIONAL DA
SAÚDE 2024

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM SAÚDE COLETIVA-2024

Prova a ser realizada pelos candidatos graduados em **ENFERMAGEM**

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Ao receber o **CADERNO DE QUESTÕES**, confira se está de acordo com o programa ao qual concorre, caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala. A não comunicação deste fato, poderá implicar na sua eliminação. Em seguida, verifique se o **CADERNO DE QUESTÕES** contém 40 (quarenta) questões, distribuídas da seguinte forma:

01 a 05 – Sistema Único de Saúde
06 a 35 – Conhecimentos Específicos
36 a 38 – Língua Portuguesa
39 a 40 – Língua Estrangeira

- Ao receber o **CARTÃO DE RESPOSTAS**, confira: se seus dados estão corretos e, em caso afirmativo, assine-o e leia atentamente as instruções para seu preenchimento.
- Cada questão proposta apresenta quatro opções de resposta, sendo apenas uma delas a correta. A questão que tiver sem opção assinalada receberá pontuação zero, assim como a que apresentar mais de uma opção assinalada, mesmo que dentre elas se encontre a correta.
- Não é permitido usar qualquer tipo de aparelho eletrônico que permita comunicação, nem material que sirva para consulta e ou cálculo.
- Não é permitido copiar as opções assinaladas no cartão de respostas.
- O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de **2 (duas) horas** e o mínimo é de **1 (uma) hora**.
- Reserve os quinze minutos finais para preencher o cartão de respostas, usando, exclusivamente, caneta esferográfica de corpo transparente de ponta média com tinta azul ou preta (preferencialmente, com tinta azul).
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
- Quando terminar, entregue ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO DE RESPOSTAS**, que poderá ser invalidado se você não o assinar.

“EXAME GRAFOTÉCNICO”

FRASE A SER TRANSCRITA PELO CANDIDATO NO LOCAL APROPRIADO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

O amor por todas as criaturas vivas é o mais notável atributo do ser humano.

Charles Darwin

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

01 De acordo com a Lei nº 8080/90, a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter:

- (A) Suplementar
- (B) Participativo
- (C) Concorrente
- (D) Complementar

02 Com relação à saúde dos povos indígenas, leia as assertivas a seguir.

- I Caberá aos Estados, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- II As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.
- III As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso.

É correto dizer que

- (A) apenas I é verdadeira.
- (B) apenas I e II são verdadeiras.
- (C) apenas II e III são verdadeiras.
- (D) todas são verdadeiras.

03 Em relação a situações emergenciais ou de calamidade pública, considere as afirmações:

- I A União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- II A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de

Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.

- III A inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde deverá ser garantida, explicitados os fluxos e as referências para o atendimento em tempo oportuno.
- IV A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde é permitida nessas situações.

São verdadeiras:

- (A) apenas II e IV
- (B) apenas I e II
- (C) apenas II e III
- (D) todas

04 Considere as ações de

- I vigilância epidemiológica
- II saúde do trabalhador
- III saúde climática/ambiental
- IV assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica

No campo de atuação do Sistema Único de Saúde, está incluída a execução de apenas

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV.

05 De acordo com o artigo 198 da constituição de 1988 todas as opções apresentam diretrizes do SUS, EXCETO:

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- (C) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- (D) Participação da comunidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

06 Em relação a Leptospirose, leia com atenção as seguintes assertivas:

- I Trata-se de uma doença infecciosa febril aguda que é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais (principalmente ratos) infectados pelo vírus *Leptospira*.
- II No Brasil, é uma doença endêmica; torna-se epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas capitais e nas regiões metropolitanas, devido às enchentes associadas à aglomeração da população de baixa renda, condições inadequadas de saneamento e alta infestação de roedores infectados.
- III As medidas de prevenção e controle devem ser direcionadas aos reservatórios (roedores e outros animais), à melhoria das condições de proteção dos trabalhadores expostos e das condições higiênico e sanitárias da população, e às medidas corretivas sobre o meio ambiente, diminuindo sua capacidade de suporte para a instalação e proliferação de roedores.
- IV Os animais infectados podem eliminar a *leptospira* através da urina durante meses, anos ou por toda a vida, segundo a espécie animal e o sorovar envolvido.

Estão corretas apenas as assertivas

- (A) I e II.
- (B) I, III e IV.
- (C) II e III.
- (D) II, III e IV.

07 A malária é a parasitose mais importante do mundo, caracterizada como uma doença febril aguda, potencialmente grave e de evolução fatal se não tratada de forma oportuna e adequada. A espécie mais prevalente dessa patologia no Brasil é causada pelo protozoário denominado

- (A) *Plasmodium malariae*.
- (B) *Plasmodium vivax*.
- (C) *Plasmodium falciparum*.
- (D) *Plasmodium brasilianum*.

08 Homem, 57 anos, apresentou tosse, febre, expectoração e perda de peso (6Kg) por três meses. Foi atendido em Unidade Básica de Saúde, com diagnóstico de tuberculose pulmonar, tendo, então, realizado tratamento com esquema RIPE – rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol – há 30 dias. Hoje nega febre e refere persistência da tosse e expectoração. Exame físico: regular estado geral. Oroscofia: placas esbranquiçadas em palato, língua e mucosa jugal. Emagrecido, descorado +/4, afebril. Peso: 54Kg. Altura 1,66m. Aparelho Respiratório: murmúrio vesicular bilateralmente sem ruídos adventícios. frequência respiratória = 22 ipm. Aparelho cardiovascular: Bulhas rítmicas em dois tempos, normofonéticas sem sopros. frequência cardíaca: 84 bpm, pressão arterial: 100 x 70 mmHg. Abdome: plano indolor, sem massas e sem visceromegalias. Teste rápido para HIV: negativo. Gasometria arterial: pH: 7,40/pO₂: 61,4/pCO₂: 34,9/HCO₃: 21,5/BE: 2,5/SatO₂: 90,8%. Para dar seguimento e controle de cura desse paciente, o exame mais indicado é

- (A) prova tuberculínica.
- (B) raio X de tórax.
- (C) baciloscopia no escarro.
- (D) teste rápido molecular no escarro.

09 Em relação à transmissão da tuberculose, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Os pacientes com exame bacteriológico de escarro positivo sustentam a cadeia de transmissão da doença. Aqueles com BAAR negativo no escarro são os que mais transmitem a doença.
- (B) No Brasil, os grupos populacionais com maior vulnerabilidade à tuberculose são pessoas em situação de rua, pessoas HIV+, pessoas privadas de liberdade, profissionais de saúde, povos indígenas e contatos de TB DR.
- (C) Os sinais e os sintomas sugestivos de TB são: febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento e inapetência. Se a doença estiver localizada em outra parte do corpo (TB extrapulmonar), os sintomas dependerão da área acometida.
- (D) O *M. tuberculosis* é transmitido por via aérea, de uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea, que elimina bacilos no ambiente (caso fonte), a outra pessoa, por exalação de aerossóis oriundos da tosse, fala ou espirro. Os bacilos que se

depositam em roupas, lençóis e outros objetos dificilmente se dispersam em aerossóis e, por isso, não têm papel na transmissão da doença.

10 A profilaxia pós-exposição ao HIV (PEP) utiliza medicamentos antirretrovirais, oferecidos gratuitamente pelo SUS, que agem evitando a sobrevivência e a multiplicação do vírus no organismo e, por isso, deve ser iniciada o mais rápido possível. Com base nesse fato, a recomendação correta sobre o tempo de início do tratamento com antirretroviral em casos de suspeita de infecção pelo HIV é de, preferencialmente, nas duas primeiras horas após a exposição ao vírus e no máximo em até

- (A) 24 horas.
- (B) 48 horas.
- (C) 72 horas.
- (D) 96 horas.

11 A presença dos sinais e sintomas a seguir são indicativos de dengue, EXCETO:

- (A) febre com duração de até sete dias, mialgia, cefaleia e prostração.
- (B) febre com duração de até dez dias, mialgia e cefaleia.
- (C) febre com três dias de evolução, artralgia e petéquias.
- (D) febre com seis dias de evolução, cefaleia, exantema e petéquias.

12 A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada, a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), ainda representam um problema de saúde pública de grande relevância na atualidade, em função de sua transcendência e seu caráter pandêmico. A infecção pelo HIV, sem tratamento, pode evoluir para AIDS, resultando em grave disfunção do sistema imunológico à medida que vão sendo destruídos os linfócitos T-CD4+, uma das principais células-alvo do HIV. Em relação ao HIV/AIDS, é correto afirmar que:

- (A) O HIV-1 e HIV-2 são retrovírus da família Lentiviridae. Pertencem ao grupo dos retrovírus citopáticos e não oncogênicos. Para se multiplicarem, necessitam de uma enzima (transcriptase reversa) responsável pela transcrição do ácido ribonucleico (RNA) viral para uma cópia do ácido desoxirribonucleico (DNA),

tornam-se capazes de se integrar ao genoma do hospedeiro.

- (B) O HIV-1 e HIV-2 são retrovírus da família Flaviviridae. Pertencem ao grupo dos retrovírus citopáticos e não oncogênicos. Para se multiplicarem, necessitam de uma enzima (transcriptase reversa) responsável pela transcrição do ácido ribonucleico (RNA) viral para uma cópia do ácido desoxirribonucleico (DNA), tornam-se capazes de se integrar ao genoma do hospedeiro.
- (C) O HIV-1 e HIV-2 são retrovírus da família Lentiviridae. Pertencem ao grupo dos retrovírus citopáticos e oncogênicos. Para se multiplicarem, necessitam de uma enzima (transcriptase reversa) responsável pela transcrição do ácido ribonucleico (RNA) viral para uma cópia do ácido desoxirribonucleico (DNA), tornam-se capazes de se integrar ao genoma do hospedeiro.
- (D) O HIV-1 e HIV-2 são retrovírus da família Lentiviridae. Pertencem ao grupo dos retrovírus citopáticos e não oncogênicos. Para se multiplicarem, necessitam de uma enzima (transcriptase reversa) responsável pela transcrição do ácido ribonucleico (DNA) viral para uma cópia do ácido desoxirribonucleico (RNA), tornam-se capazes de se integrar ao genoma do hospedeiro.

13 A história natural da infecção pelo HIV vem sendo alterada, consideravelmente, pela terapia antirretroviral (TARV), iniciada no Brasil em 1996, e pelo tratamento para todas as pessoas vivendo com o vírus, independentemente da carga viral, em 2013, o que resultou em aumento da sobrevida das pessoas, mediante reconstituição das funções do sistema imunológico e redução de doenças secundárias. Em relação ao HIV/AIDS, assinale a opção correta.

- (A) Após a infecção aguda, o tempo de desenvolvimento de sinais e de sintomas da AIDS é em média doze meses. Entretanto sinais e sintomas de imunodeficiência associada à infecção pelo HIV, não AIDS, podem aparecer com período de latência variável após a infecção aguda.
- (B) O tempo entre a infecção pelo HIV e o aparecimento de sinais e de sintomas da

fase aguda, denominada síndrome retroviral aguda (SRA), é de uma a três semanas.

- (C) A transmissão vertical do HIV acontece pela passagem do vírus para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. Até o momento não existem medidas capazes de reduzir este risco.
- (D) Em relação às gestantes vivendo com HIV, a TARV deve ser suspensa independentemente de critérios clínicos e imunológicos, devido ao seu risco de teratogenicidade.

14 As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Têm distribuição universal, sendo observadas diferenças regionais de acordo com o agente etiológico.

Com o objetivo de evitar a contaminação pelo vírus da hepatite A, a orientação mais adequada para um adulto não vacinado é

- (A) usar preservativo nas relações sexuais.
- (B) não compartilhar seringas e agulhas.
- (C) não se vacinar.
- (D) higienizar os alimentos, especialmente os ingeridos crus.

15 A sífilis é uma infecção sistêmica, de evolução crônica. Quando não tratada, progride ao longo dos anos por vários estágios clínicos, que se dividem em sífilis recente (primária, secundária, latente recente) e tardia (latente tardia e terciária).

Em relação a essa enfermidade, assinale a opção correta.

- (A) A suscetibilidade à infecção pelo *Treponema pallidum* é universal e os anticorpos produzidos em infecções anteriores são protetores.
- (B) Seu agente etiológico é o *Treponema pallidum*, é uma bactéria Gram-negativa, do grupo das espiroquetas, de alta patogenicidade.
- (C) O *Treponema pallidum*, quando presente na corrente sanguínea da gestante, não é capaz de atravessar a barreira placentária e penetrar na corrente sanguínea do feto.

- (D) A benzilpenicilina benzatina não é mais considerada o medicamento de escolha para o tratamento da sífilis adquirida em gestantes, pois não se trata de uma opção segura e eficaz para o tratamento adequado desse grupo populacional.

16 Assinale a opção que contém uma das diretrizes gerais da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: uma política para o SUS de 2013.

- (A) Incrementar as disparidades étnico-raciais no acesso aos serviços de saúde.
- (B) Garantir e ampliar o acesso da população negra do campo e da floresta, em particular as populações quilombolas, às ações e aos serviços de saúde.
- (C) Inclusão dos temas Racismo e Saúde da População Negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no exercício do controle social na saúde.
- (D) Promover o reconhecimento dos saberes e práticas populares de saúde, excluindo aqueles preservados pelas religiões de matrizes africanas.

17 De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis de 2015, considera-se inadequado à gestante com sífilis:

- (A) relação com parceiro sexual com sífilis não tratado ou tratado indevidamente.
- (B) tratamento com dose única de Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM (1,2 milhão UI em cada glúteo), em caso de sífilis primária, sífilis secundária e latente recente.
- (C) tratamento com penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, (1,2 milhão UI em cada glúteo), semanal, por três semanas; dose total de 7,2 milhões UI, em caso de sífilis latente tardia ou latente com duração ignorada e sífilis terciária.
- (D) tratamento não penicilínico, que só deve ser considerado como opção nas contraindicações absolutas ao uso da penicilina.

18 Dentre os princípios e diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de 2012, descarta-se a

- (A) precaução.
- (B) ergonomia.
- (C) hierarquização.
- (D) integralidade.

19 Assinale a opção que corresponde ao método padrão ouro para diagnóstico da malária.

- (A) Hemograma
- (B) Parasitológico
- (C) Hemocultura
- (D) Microscopia de gota espessa de sangue

20 Segundo o Guia de Tratamento da Malária no Brasil de 2021, apresentam risco elevado de doença grave:

- (A) crianças menores de cinco anos de idade.
- (B) gestantes.
- (C) indivíduos esplenectomizados.
- (D) indivíduos provenientes de áreas onde a malária é endêmica.

21 Considerando os determinantes distais, intermediários e proximais na análise das condições de vida de uma população, é correto afirmar que determinantes distais

- (A) abrangem o desenvolvimento e a riqueza de um país; determinantes intermediários compreendem as condições de vida e de trabalho, o acesso à alimentação, à educação, à produção cultural, ao emprego, à habitação, ao saneamento; determinantes proximais incluem às características dos indivíduos, que exercem influência sobre seu potencial, sua condição de saúde.
- (B) referem-se às características dos indivíduos; determinantes intermediários envolvem as condições socioeconômicas; determinantes proximais incluem fatores como acesso à alimentação e habitação.
- (C) representam as condições de vida e de trabalho; determinantes intermediários estão relacionados às características dos indivíduos; determinantes proximais envolvem aspectos como desenvolvimento e riqueza de um país.

(D) são influenciados por características individuais; determinantes intermediários referem-se ao acesso à educação e emprego; determinantes proximais incluem as condições socioeconômicas e culturais.

22 Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 32 de 2013, estão entre os exames solicitados no primeiro trimestre do Pré-Natal de baixo risco:

- (A) teste de tolerância para glicose com 75g, se a glicemia estiver acima de 85mg/dl ou se houver fator de risco e Coombs indireto (se for Rh negativo).
- (B) bacterioscopia de secreção vaginal e hemograma.
- (C) urocultura mais urina tipo I e toxoplasmose se o IgG não for reagente.
- (D) toxoplasmose IgM e IgG e teste rápido diagnóstico anti-HIV.

23 De acordo com os dados apresentados a seguir, sobre a Covid-19, assinale a opção correta, considerando a população do Brasil de 210.147.125 habitantes.

COVID-19	2020	2021	2022
Casos Notificados	7.675.973	14.611.548	14.043.760
Óbitos	194.949	424.107	74.797

- (A) A maior taxa de incidência foi no ano de 2022.
- (B) A maior taxa de letalidade foi em 2020 e a menor em 2022.
- (C) O ano de maior taxa de incidência foi 2021 e o de menor taxa de letalidade foi 2022.
- (D) A taxa de incidência e a taxa de letalidade aumentaram conforme o passar dos anos, ficando 2022 com as maiores taxas do período.

24 De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, a temperatura controlada de armazenamento de imunobiológicos deve estar entre

- (A) +2°C a +8 °C e -20 °C a -15 °C.
- (B) -8°C a -2 °C e +15 °C a +20 °C.
- (C) +5°C a +10 °C e -25 °C a -10 °C.
- (D) -10°C a -5 °C e +10 °C a +25 °C.

25 Segundo o documento Prevenção do Suicídio: Um manual para profissionais da saúde em atenção primária de 2018, o “Suicídio é um problema complexo para o qual não existe uma única causa ou uma única razão. Ele resulta de uma complexa interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais”.

Assim sendo, leia os itens relacionados a seguir.

- 1 Estado mental atual e pensamentos sobre morte e suicídio.
- 2 Plano suicida atual – quão preparada a pessoa está e quão cedo o ato está para ser realizado.
- 3 Sistema de apoio social da pessoa (família, amigos, etc.).

É correto afirmar que são aspectos que necessitam ser avaliados pelo profissional de saúde os itens

- (A) 1 e 2 apenas.
- (B) 1, 2 e 3.
- (C) 1 e 3 apenas
- (D) 2 e 3 apenas.

26 Assinale a opção que representa o sistema de informação onde são registrados eventos adversos relacionados a imunobiológicos.

- (A) SIPNI
- (B) SINAN
- (C) SI-EAPV
- (D) SINASN

27 Um pesquisador pretende investigar a relação entre o consumo regular de cafeína em adultos e o desenvolvimento de hipertensão arterial ao longo de 10 anos. Ele planeja recrutar indivíduos que consomem cafeína regularmente e um grupo que não a consome. Todos serão acompanhados ao longo do tempo para avaliar a ocorrência de hipertensão arterial. Tendo essas informações, o delineamento de estudo epidemiológico mais apropriado para essa investigação é o

- (A) estudo de caso-controle.
- (B) estudo de coorte.
- (C) estudo transversal.
- (D) ensaio clínico.

28 Aponte o tipo viral oncogênico que está associado a aproximadamente 70% dos casos de câncer do colo do útero.

- (A) HPV 16 e 18
- (B) HPV 6 e 11
- (C) HPV 12 e 14
- (D) HPV 11 e 14

29 Qual das opções abaixo melhor descreve a Medicina Antroposófica?

- (A) Abordagem médico-terapêutica isolada, focada apenas em tratamentos específicos.
- (B) Abordagem de base mecanicista, que se baseia principalmente em processos biológicos e físicos para compreender e tratar as condições de saúde.
- (C) Prática disciplinar específica, limitada a uma única área de atuação no campo da saúde.
- (D) Abordagem médico-terapêutica complementar, de base vitalista, com organização transdisciplinar, visando à integralidade do cuidado em saúde.

30 O indicador antropométrico considerado o melhor para avaliar o crescimento de uma criança entre dois e dez anos de idade, sendo também o deficit antropométrico mais significativo no Brasil, é

- (A) circunferência da cabeça.
- (B) peso corporal.
- (C) altura para a idade.
- (D) índice de massa corporal (IMC).

31 De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica de 2017, a Atenção Básica

- (A) é ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, desconsiderando os determinantes e condicionantes de saúde.
- (B) é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

- (C) será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- (D) proíbe qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.

32 A abordagem recomendada pelo Ministério da Saúde em 2006 para a implantação da triagem auditiva neonatal no Sistema Único de Saúde (SUS) foi

- (A) implementar a triagem auditiva neonatal de forma universal para todos os recém-nascidos.
- (B) iniciar a triagem auditiva neonatal apenas para recém-nascidos com deficiência auditiva confirmada.
- (C) excluir a triagem auditiva neonatal das recomendações do Pacto pela Saúde.
- (D) realizar a triagem auditiva neonatal de forma gradativa, começando por crianças com risco para deficiência auditiva e expandindo para outros recém-nascidos à medida que a estrutura para diagnóstico e intervenção é estabelecida.

33 No município de Cabo Frio, foram notificados ao departamento de vigilância em saúde cerca de 80 casos novos de dengue durante os meses de março de 2019 a dezembro de 2022. Por se tratar de uma doença infecciosa, a medida epidemiológica que deve ser utilizada para quantificar a frequência desse agravo à saúde é

- (A) a incidência.
- (B) a razão de prevalência.
- (C) a prevalência.
- (D) o risco relativo.

34 Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 32, no que diz respeito à vacina BCG, marque a opção correta.

- (A) Essa vacina fornece proteção para todas as formas de tuberculose.
- (B) Para os prematuros com menos de 36 semanas, administre a vacina depois que eles completarem um mês de vida e atingirem 2kg de peso.

- (C) Para a criança HIV positiva, a vacina deve ser administrada 30 dias após o nascimento.
- (D) Essa vacina é eficaz contra todas as infecções respiratórias, incluindo gripes e resfriados.

35 A Portaria GM/MS nº 635, de 22 de maio de 2023, estabelece diretrizes para custeio e implantação das equipes multiprofissionais (eMulti). Sendo assim, assinale a opção correta sobre a classificação das eMulti de acordo com a carga horária, vinculação e composição profissional.

- (A) Equipe Multiprofissional Ampliada (400 horas semanais e dez a doze equipes vinculadas).
- (B) Equipe Multiprofissional Complementar (100 horas semanais e cinco a nove equipes vinculadas).
- (C) Equipe Multiprofissional Estratégica (100 horas semanais e uma a quatro equipes vinculadas).
- (D) Equipe Multiprofissional Principal (250 horas semanais e oito a dez equipes vinculadas).

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

A noção de texto

O texto é, em princípio, um signo, o que quer dizer que possui um significado, um conteúdo veiculado por meio de uma expressão, que pode ser verbal, visual, entre 5 outros tipos. No texto verbal escrito, temos as ideias expressas em frases encadeadas em parágrafos, os quais, por sua vez, também se encadeiam entre si. No texto visual, temos as ideias expressas num conjunto formado pela 10 combinação de cores, distribuição de formas, jogos de linhas e volumes, unidades todas encadeadas no espaço da tela, do papel, da madeira etc. Um único texto pode apresentar a união de vários tipos de expressão, como a 15 verbal e a visual. O texto é dito sincrético, se juntar em si dois meios diferentes de expressão. O anúncio publicitário, se unir o verbal e o visual para construir sentido, é um exemplo de texto sincrético.

Fonte: DISCINI, Norma. A noção de texto. In: A comunicação nos textos, São Paulo: Contexto, 2005, p.29. Fragmento.

36 A estrutura do texto “A noção de texto” é predominantemente:

- (A) descritiva
- (B) expositiva
- (C) narrativa
- (D) injuntiva

37 “No texto verbal escrito, temos as ideias expressas em frases encadeadas em parágrafos...” (Linhas 5-7)

A vírgula, **em negrito**, no enunciado acima, justifica-se para

- (A) indicar a supressão de um termo.
- (B) separar elementos com a mesma função sintática.
- (C) destacar o apostro.
- (D) isolar o adjunto adverbial antecipado.

38 O vocábulo “se” sublinhado em “O texto é dito sincrético, se juntar em si dois meios diferentes de expressão.” (Linhas 15-17) veicula ideia de:

- (A) condição
- (B) concessão
- (C) consequência
- (D) causa

LÍNGUA ESPANHOLA

Lee el siguiente texto y escoge la opción correcta en las cuestiones formuladas seguidamente:

EL CONSUMO ABUSIVO DE PSICOFÁRMACOS EN ESPAÑA

14 Ene 2009

Tal y como *Infocop Online* viene denunciando desde hace algún tiempo, los recursos para la salud mental en España son insuficientes. Los problemas psicológicos presentan un constante aumento; sin embargo, el abordaje que el sistema sanitario español ofrece a estos pacientes se fundamenta principalmente en los fármacos. En relación a esto, recientemente han aparecido dos noticias en diversos medios de comunicación (El País y la Agencia EFE) en las que se denuncia el abuso de los psicofármacos que existe en España. Alrededor de un 30-60% de los pacientes que acuden a atención primaria presentan problemas psicológicos como ansiedad o

depresión, a lo que se responde con la receta de antidepresivos o ansiolíticos, lo que supone un coste a los españoles de, aproximadamente, 745 y 231 millones de euros anuales respectivamente.

En ambas fuentes se argumenta que son los propios pacientes los que demandan a sus médicos de atención primaria su receta, puesto que su consumo se ha normalizado y banalizado en la sociedad actual, así como cada vez se tolera menos el estrés, las frustraciones o el dolor, por lo que la persona busca la inmediatez del fármaco, según afirma Vicente Prieto Cabra (vocal del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid) en *El País* y se comenta en el artículo de la Agencia EFE.

Disponible en: <https://www.infocop.es/el-consumo-abusivo-de-psicofarmacos-en-espana/>. Acceso en: 13 nov. 2023.

39 En el texto se expone una relación entre

- (A) el incremento de problemas de salud mental y el uso de terapias alternativas.
- (B) la banalización del estrés y el dolor y el abuso de ansiolíticos y antidepresivos.
- (C) el aumento de los problemas psicológicos y el uso cada vez mayor de fármacos.
- (D) la estabilización de la salud mental de población y el empleo abusivo de fármacos.

40 Según el artículo, los ansiolíticos y antidepresivos suelen ser recetados, en la atención primaria, por

- (A) vecinos.
- (B) médicos.
- (C) psicólogos.
- (D) psiquiatras.

LÍNGUA INGLESA

TEXT 1

Gene therapy has been under development for more than 30 years, but several recent major advances point to clinical feasibility, including the development of robust molecular technologies for gene editing in human cells. In parallel, affordable genome sequencing has accelerated our ability to identify the genetic causes of disease. With these advances, we may now expect a widespread use of gene therapy. Already, nearly 1,000 clinical trials testing gene therapies are ongoing, and the

rhythm of clinical developments is likely to accelerate. This will bring hope for the cure of many genetic and even non-genetic diseases. (Dr Feng Zhang)

Available from: <https://www.nature.com/articles/s41591-019-0693-y>. Access Oct. 20, 2023. Adapted.

TEXT 2

To fulfil the potential of gene therapy is not as simple as one might think. In order to ensure that all patients have access to this revolutionary treatment, we will need: a) to develop delivery approaches that are practical and widely usable; b) to refine molecular technologies for gene editing; c) to push our understanding of gene function in health and disease forward, and, finally, to engage with all members of society to openly discuss the risks and benefits of gene therapy. Only when these conditions are met, we will be able to envisage the successful genetic treatments of most diseases. (Dr. Shrikant Mali)

Available from:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3722627/>.
Access Oct. 20, 2023. Adapted.

39 Gene therapy has recently been receiving a lot of attention from scientists and researchers. Among these, some are more optimistic, while others are more cautious. Considering Dr Feng Zhang's and Dr. Shrikant Mali's views on the future of gene therapy, expressed, respectively, in Text 1 and Text 2, it can be said that

- (A) Dr. Zhang's view is more cautious than that of Dr Mali's.
- (B) Dr. Zhang's view is more optimistic than that of Dr. Mali's.
- (C) both doctors have optimistic views on the topic.
- (D) both doctors express cautious views on the topic.

40 Considering that "*nearly 1,000 clinical trials are ongoing, and the pace of clinical developments is likely to accelerate*" (Text 1), it is correct to say that

- (A) the pace of clinical developments will probably slow down.
- (B) approximately 1,000 clinical trials have been concluded.
- (C) almost 1,000 clinical trials are currently being carried out.
- (D) far more than 1,000 clinical trials testing gene therapies are ongoing.