

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA PROFISSIONAL DA
SAÚDE 2024

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO - FACIAIS - 2024

Prova a ser realizada pelos candidatos graduados em **ODONTOLOGIA**

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Ao receber o **CADERNO DE QUESTÕES**, confira se está de acordo com o programa ao qual concorre, caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala. A não comunicação deste fato, poderá implicar na sua eliminação. Em seguida, verifique se o **CADERNO DE QUESTÕES** contém 40 (quarenta) questões, distribuídas da seguinte forma:

01 a 05 – Sistema Único de Saúde
06 a 35 – Conhecimentos Específicos
36 a 38 – Língua Portuguesa
39 a 40 – Língua Estrangeira

- Ao receber o **CARTÃO DE RESPOSTAS**, confira: se seus dados estão corretos e, em caso afirmativo, assine-o e leia atentamente as instruções para seu preenchimento.
- Cada questão proposta apresenta quatro opções de resposta, sendo apenas uma delas a correta. A questão que tiver sem opção assinalada receberá pontuação zero, assim como a que apresentar mais de uma opção assinalada, mesmo que dentre elas se encontre a correta.
- Não é permitido usar qualquer tipo de aparelho eletrônico que permita comunicação, nem material que sirva para consulta e ou cálculo.
- Não é permitido copiar as opções assinaladas no cartão de respostas.
- O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de **2 (duas) horas** e o mínimo é de **1 (uma) hora**.
- Reserve os quinze minutos finais para preencher o cartão de respostas, usando, exclusivamente, caneta esferográfica de corpo transparente de ponta média com tinta azul ou preta (preferencialmente, com tinta azul).
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
- Quando terminar, entregue ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO DE RESPOSTAS**, que poderá ser invalidado se você não o assinar.

“EXAME GRAFOTÉCNICO”

FRASE A SER TRANSCRITA PELO CANDIDATO NO LOCAL APROPRIADO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

O amor por todas as criaturas vivas é o mais notável atributo do ser humano.

Charles Darwin

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

01 De acordo com a Lei nº 8080/90, a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter:

- (A) Suplementar
- (B) Participativo
- (C) Concorrente
- (D) Complementar

02 Com relação à saúde dos povos indígenas, leia as assertivas a seguir.

- I Caberá aos Estados, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- II As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.
- III As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso.

É correto dizer que

- (A) apenas I é verdadeira.
- (B) apenas I e II são verdadeiras.
- (C) apenas II e III são verdadeiras.
- (D) todas são verdadeiras.

03 Em relação a situações emergenciais ou de calamidade pública, considere as afirmações:

- I A União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- II A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da

direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.

- III A inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde deverá ser garantida, explicitados os fluxos e as referências para o atendimento em tempo oportuno.
- IV A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde é permitida nessas situações.

São verdadeiras:

- (A) apenas II e IV
- (B) apenas I e II
- (C) apenas II e III
- (D) todas

04 Considere as ações de

- I vigilância epidemiológica
- II saúde do trabalhador
- III saúde climática/ambiental
- IV assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica

No campo de atuação do Sistema Único de Saúde, está incluída a execução de apenas

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, III e IV.

05 De acordo com o artigo 198 da constituição de 1988 todas as opções apresentam diretrizes do SUS, EXCETO:

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- (B) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- (C) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- (D) Participação da comunidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

06 Quando realizamos o bloqueio intermaxilar durante o tratamento de uma fratura de mandíbula, a etapa da cirurgia que está sendo cumprida é

- (A) a exposição da fratura.
- (B) a fixação interna.
- (C) o fechamento.
- (D) a redução da fratura.

07 A principal área doadora para reconstrução de arco central de mandíbula em grandes defeitos é

- (A) o ilíaco.
- (B) a costela.
- (C) a fíbula microcirúrgica.
- (D) a calota craniana.

08 Paciente apresenta osteonecrose dos maxilares por uso de medicação antireabsortiva, com exposição do osso necrótico, dor e eritema local e secreção purulenta. Nesse caso, a doença encontra-se no estágio

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.

09 Todas as opções a seguir são indicações no tratamento da anquilose fibrosa, EXCETO:

- (A) prótese de ATM.
- (B) remoção de tecido fibroso.
- (C) reposição do disco ou interposição de fascia temporal.
- (D) condilectomia e reconstrução com enxerto costal.

10 Cada lado do terço médio do esqueleto facial contém o seguinte número de pilares verticais:

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 6

11 Marque a opção em que todos os itens são considerados fraturas de mandíbula em osso de baixa qualidade.

- (A) Fratura Infectada, Fratura em mandíbula atrofica, Fratura bilateral de mandíbula
- (B) Fratura cominutiva, Fratura de cabeça de côndilo, Fratura bilateral de mandíbula
- (C) Fratura em mandíbula atrofica, Fratura de côndilo, fratura bilateral de mandíbula
- (D) Fratura cominutiva, Fratura em mandíbula atrofica, Fratura com defeito mandibular

12 Hipoplasia do terço médio facial, acrobraquicefalia, proptose ocular e sindactilia são características da síndrome de

- (A) Apert.
- (B) Crouzon.
- (C) Treacher-Collins.
- (D) Gardner.

13 A síndrome que cursa com macroglossia, onfalocele e gigantismo é denominada

- (A) Proteus.
- (B) Beckwith-Wiedmann.
- (C) Von Recklinghausen.
- (D) Gorlin Goltz.

14 Marque a opção que apresenta corretamente a síndrome com sua patologia associada.

- (A) Gardner – polipose intestinal
- (B) Von Recklinghausen – osteoma
- (C) Crouzon – hipoplasia dos zigomas
- (D) Moebius – ceratocisto odontogênico

15 Indique uma característica clínica da síndrome de Gorlin que aparece com uma frequência menor que 50% nos pacientes acometidos.

- (A) Ceratocisto odontogênico
- (B) Calcificação da foice cerebral
- (C) Costela bífida
- (D) Estrabismo (exotropia)

16 A dose máxima de lidocaína a 2% com adrenalina 1:200.000 que deve ser usada em uma criança de 18 kg é de

- (A) 40mg.
- (B) 50mg.
- (C) 60mg.
- (D) 80mg.

- 17** Indique, dentre as lesões a seguir, aquela que é de origem epitelial.
- (A) Ameloblastoma
(B) Fibroma odontogênico
(C) Cementoblastoma
(D) Displasia cementaria periapical
- 18** O tempo de duração da esplintagem dentária numa criança que sofreu um trauma dentoalveolar com extrusão é de
- (A) duas semanas.
(B) três semanas.
(C) dez dias.
(D) mais de quatro semanas.
- 19** O tipo de articulação que apresenta uma ótima capacidade de remodelação é a
- (A) sinovial.
(B) cartilaginosa.
(C) fibrosa.
(D) dental.
- 20** Ao realizar-se uma osteotomia sagital e ocorre um *bad split*, o tipo que tem manejo mais difícil se dá quando
- (A) a fratura ocorre na parede vestibular do segmento proximal.
(B) a fratura corre para a região condilar e separa o côndilo.
(C) a fratura da tábua lingual do segmento distal gera um segmento ósseo livre.
(D) a fratura do processo coronoide no segmento proximal ocorre isoladamente.
- 21** Pacientes com reabsorção condilar idiopática geralmente apresentam o seguinte tipo de alteração oclusal:
- (A) mordida cruzada posterior
(B) classe III com mordida aberta
(C) classe II com mordida aberta anterior
(D) sobremordida profunda
- 22** A principal indicação do retalho de temporal é
- (A) a reanimação facial.
(B) a interposição na região de ATM em casos de anquilose.
(C) o fechamento de defeitos orbitários após exenteração.
(D) o fechamento de defeitos maxilares.
- 23** O único tipo de enxerto com propriedade osteogênica é o
- (A) aloenxerto.
(B) xenógeno.
(C) aloplástico.
(D) autógeno.
- 24** Numa fratura do assoalho de órbita, o melhor corte tomográfico para avaliação mesiodistal do defeito é
- (A) o axial.
(B) o sagital.
(C) o coronal.
(D) a reconstrução 3D.
- 25** O músculo da órbita que se origina no aspecto medial do assoalho da órbita e é innervado pelo 3º par craniano é o
- (A) reto inferior.
(B) oblíquo inferior.
(C) reto superior.
(D) oblíquo superior.
- 26** As principais características da síndrome de Muir-Torre são
- (A) neoplasma sebáceo, ceratoacantoma e carcinoma gastrointestinal.
(B) ceratocisto múltiplos, ceratoacantoma e carcinoma epidermóide.
(C) carcinoma basocelular, nevo basocelular e ceratocisto múltiplos.
(D) ceratoacantoma, carcinoma basocelular e neoplasma sebáceo.
- 27** Aponte as principais características da síndrome de Paterson-Kelly.
- (A) Anemia de fanconi, miosite e dislalia
(B) Anemia falciforme, sialolitíase e dispneia
(C) Anemia ferropriva, glossite e disfagia
(D) Anemia aplásica, osteíte e displasia
- 28** Todas as situações abaixo são indicações do uso terapêutico de antibióticos em infecções odontogênicas, EXCETO
- (A) linfadenopatia.
(B) abscesso periapical.
(C) temperatura maior que 38,3 °C.
(D) pericoronarite grave.

29 Aponte a estrutura que, quando lesada, pode deixar o centro da pálpebra caído anteriormente longe do globo ocular.

- (A) Músculo de Horner
- (B) Músculo levantador da pálpebra superior
- (C) Saco lacrimal
- (D) Tubérculo de Whitnall

30 O plano anatômico em que se espera encontrar o nervo facial na região temporal é conhecido como

- (A) fáscia subgaleal.
- (B) fáscia temporal.
- (C) coxim temporal.
- (D) fáscia temporoparietal.

31 O principal uso do aparelho de Hertel nos traumas orbitários é na avaliação da

- (A) distopia ocular.
- (B) acuidade visual.
- (C) projeção ocular.
- (D) mobilidade ocular.

32 A inibição do tromboxano A2 pode afetar a função

- (A) das hemácias.
- (B) das plaquetas.
- (C) dos hepatócitos.
- (D) dos linfócitos.

33 Todas as condições a seguir são caracterizadas como mucopolissacaridoses, EXCETO:

- (A) Sanfilippo-A
- (B) Maroteaux-Lamy
- (C) Hunter
- (D) Tay-Sachs

34 Aponte a síndrome em que é frequente se observar a puberdade precoce.

- (A) Ramsay Hunt
- (B) Papillon-LeFèvre
- (C) McCune-Albright
- (D) Peutz-Jeghers

35 O tempo médio de duração de um bloqueio pulpar do nervo alveolar inferior e lingual com o anestésico mepivacaína 3% sem vasoconstritor é de:

- (A) 5 – 10 min
- (B) 10 – 20 min
- (C) 20 – 40 min
- (D) 40 – 60 min

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

A noção de texto

O texto é, em princípio, um signo, o que quer dizer que possui um significado, um conteúdo veiculado por meio de uma expressão, que pode ser verbal, visual, entre 5 outros tipos. No texto verbal escrito, temos as ideias expressas em frases encadeadas em parágrafos, os quais, por sua vez, também se encadeiam entre si. No texto visual, temos as ideias expressas num conjunto formado pela 10 combinação de cores, distribuição de formas, jogos de linhas e volumes, unidades todas encadeadas no espaço da tela, do papel, da madeira etc. Um único texto pode apresentar a 15 união de vários tipos de expressão, como a verbal e a visual. O texto é dito sincrético, se juntar em si dois meios diferentes de expressão. O anúncio publicitário, se unir o verbal e o visual para construir sentido, é um exemplo de texto sincrético.

Fonte: DISCINI, Norma. A noção de texto. In: A comunicação nos textos, São Paulo: Contexto, 2005, p.29. Fragmento.

36 A estrutura do texto “A noção de texto” é predominantemente:

- (A) descritiva
- (B) expositiva
- (C) narrativa
- (D) injuntiva

37 “No texto verbal escrito, temos as ideias expressas em frases encadeadas em parágrafos...” (Linhas 5-7)

A vírgula, **em negrito**, no enunciado acima, justifica-se para

- (A) indicar a supressão de um termo.
- (B) separar elementos com a mesma função sintática.
- (C) destacar o aposto.
- (D) isolar o adjunto adverbial antecipado.

38 O vocábulo “se” sublinhado em “O texto é dito sincrético, se juntar em si dois meios diferentes de expressão.” (Linhas 15-17) veicula ideia de:

- (A) condição
- (B) concessão
- (C) consequência
- (D) causa

LÍNGUA ESPANHOLA

Lee el siguiente texto y escoge la opción correcta en las cuestiones formuladas seguidamente:

EL CONSUMO ABUSIVO DE PSICOFÁRMACOS EN ESPAÑA

14 Ene 2009

Tal y como *Infocop Online* viene denunciando desde hace algún tiempo, los recursos para la salud mental en España son insuficientes. Los problemas psicológicos presentan un constante aumento; sin embargo, el abordaje que el sistema sanitario español ofrece a estos pacientes se fundamenta principalmente en los fármacos. En relación a esto, recientemente han aparecido dos noticias en diversos medios de comunicación (El País y la Agencia EFE) en las que se denuncia el abuso de los psicofármacos que existe en España. Alrededor de un 30-60% de los pacientes que acuden a atención primaria presentan problemas psicológicos como ansiedad o depresión, a lo que se responde con la receta de antidepresivos o ansiolíticos, lo que supone un coste a los españoles de, aproximadamente, 745 y 231 millones de euros anuales respectivamente.

En ambas fuentes se argumenta que son los propios pacientes los que demandan a sus médicos de atención primaria su receta, puesto que su consumo se ha normalizado y banalizado en la sociedad actual, así como cada vez se tolera menos el estrés, las frustraciones o el dolor, por lo que la persona busca la inmediatez del fármaco, según afirma Vicente Prieto Cabra (vocal del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid) en El País y se comenta en el artículo de la Agencia EFE.

Disponibile en: <https://www.infocop.es/el-consumo-abusivo-de-psicofarmacos-en-espana/>. Acceso en: 13 nov. 2023.

39 En el texto se expone una relación entre

- (A) el incremento de problemas de salud mental y el uso de terapias alternativas.
- (B) la banalización del estrés y el dolor y el abuso de ansiolíticos y antidepresivos.
- (C) el aumento de los problemas psicológicos y el uso cada vez mayor de fármacos.
- (D) la estabilización de la salud mental de población y el empleo abusivo de fármacos.

40 Según el artículo, los ansiolíticos y antidepresivos suelen ser recetados, en la atención primaria, por

- (A) vecinos.
- (B) médicos.
- (C) psicólogos.
- (D) psiquiatras.

LÍNGUA INGLESA

TEXT 1

Gene therapy has been under development for more than 30 years, but several recent major advances point to clinical feasibility, including the development of robust molecular technologies for gene editing in human cells. In parallel, affordable genome sequencing has accelerated our ability to identify the genetic causes of disease. With these advances, we may now expect a widespread use of gene therapy. Already, nearly 1,000 clinical trials testing gene therapies are ongoing, and the rhythm of clinical developments is likely to accelerate. This will bring hope for the cure of many genetic and even non-genetic diseases. (Dr Feng Zhang)

Available from: <https://www.nature.com/articles/s41591-019-0693-y>. Access Oct. 20, 2023. Adapted.

TEXT 2

To fulfil the potential of gene therapy is not as simple as one might think. In order to ensure that all patients have access to this revolutionary treatment, we will need: a) to develop delivery approaches that are practical and widely usable; b) to refine molecular technologies for gene editing; c) to push our understanding of gene function in health and disease forward, and, finally, to engage with all members of society to openly discuss the risks and benefits of gene therapy. Only when these

conditions are met, we will be able to envisage the successful genetic treatments of most diseases. (Dr. Shrikant Mali)

Available from:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3722627/>.
Access Oct. 20, 2023. Adapted.

39 Gene therapy has recently been receiving a lot of attention from scientists and researchers. Among these, some are more optimistic, while others are more cautious. Considering Dr Feng Zhang's and Dr. Shrikant Mali's views on the future of gene therapy, expressed, respectively, in Text 1 and Text 2, it can be said that

- (A) Dr. Zhang's view is more cautious than that of Dr Mali's.
- (B) Dr. Zhang's view is more optimistic than that of Dr. Mali's.
- (C) both doctors have optimistic views on the topic.
- (D) both doctors express cautious views on the topic.

40 Considering that "*nearly 1,000 clinical trials are ongoing, and the pace of clinical developments is likely to accelerate*" (Text 1), it is correct to say that

- (A) the pace of clinical developments will probably slow down.
- (B) approximately 1,000 clinical trials have been concluded.
- (C) almost 1,000 clinical trials are currently being carried out.
- (D) far more than 1,000 clinical trials testing gene therapies are ongoing.

