

**CONCURSO PÚBLICO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O  
QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ – EDITAL 1/2023**

**RESPOSTAS AOS RECURSOS – Nível Superior**

Disciplina  Língua Portuguesa

Legislação do SUS

Conhecimento Específico

**EMPREGO: CIRURGIÃO DENTISTA**

<b>N° da Questão</b>	<b>Opção de resposta por extenso</b>	<b>Parecer da Banca</b>	<b>Deferido ou Indeferido</b>	<b>Questão anulada ou Opção de Resposta correta</b>
<b>21</b>	Cisto gengival do adulto	Os itens I, II, III e IV da questão estão corretos.	<b>DEFERIDO</b>	<b>ANULADA</b>
<b>22</b>	(E) Dose máxima recomendada de articaína com vasoconstrictor	A maioria dos autores incluindo Malamed (bibliografia específica de anestésicos locais), Peterson et al (pag. 125) assim como a indústria farmacêutica que produz o fármaco preconizam a dose máxima de 7 miligramas por quilo de peso.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
<b>23</b>	(D) Ceratocisto odontogênico	O ceratocisto odontogênico é componente da síndrome de Gorlin. Neville, pag.689.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
<b>24</b>	(C) Alavanca triangular	Peterson et al, pag 105 afirmam que a alavanca triangular é mais usada quando uma raiz fraturada permanece no alvéolo dentário e o alvéolo adjacente está vazio.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO

25	(B) Impactação distoangular	A impactação distoangular é considerada a mais difícil de se resolver. Peterson et al., pag 207	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
27	(A) Classificação de Pell e Gregory	Na classe III de Pell e Gregory o terceiro molar encontra-se retido dentro do ramo mandibular. Peterson et al, pag. 209.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
28	Coloração da superfície dos dentes.	Questão em desacordo com as normas do Edital. Apresenta duas opções corretas	<b>DEFERIDO</b>	<b>ANULADA</b>
29	(A) Dens in dent	O dens in dent predomina nos dentes superiores e existem os tipos I, II e III. Neville pags. 89-90	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
30	(B) Abscesso fênix	As alterações inflamatórias secundárias agudas que acometem os granulomas periapicais são conhecidas como abscesso fênix. Neville, pág. 127.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
31	(E) inibição das ciclooxigenases 1 e 2	O mecanismo de ação do ibuprofeno no controle da dor se dá através da inibição das ciclooxigenases 1 e 2. Lopes e Siqueira, pag. 777	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
32	(C) Pulpites	As características clínicas das pulpites estão descritas por Neville.pag 120. A opção que atende ao comando da questão é a letra C	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
33	(E) Cisto periodontal lateral	Todos os itens descritos na questão estão corretos. Neville pags. 694-695	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
34	(B) Ceratocisto odontogênico	O erro de grafia no enunciado não interfere com o entendimento do comando da questão.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
36	(B) Sobredosagem leve ou moderada de anestésicos locais	Convulsões tônico-clônicas geralmente ocorrem em intoxicações maiores que 7,5 microgramas /ml. Geralmente não estão presentes nos casos de intoxicação leve e moderada como refere a questão. Malamed, pag.314.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
38	(E) Fórceps para extração de molares inferiores	O fórceps nº 151 (utilizado para incisivos e caninos) e o 17 não são usados para molares inferiores que tenham raiz em forma cônica. Para esses propósitos é indicado o fórceps nº 222.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
39	(A) Razão Normalizada Internacional (INR)	No caso descrito a INR deve estar na faixa de 1,5 a 2.0. Peterson et al, pag 20, 2º parágrafo.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO

40	(C) Meia-vida de anestésico	O comando da questão pede dentre os anestésicos locais mencionados aquele com a menor vida-média e nesse sentido a resposta correta é a procaína. Malamed, pag. 29	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
42	(D) Osteíte condensante	Os pré-molares e molares inferiores na osteíte condensante apresentam pupite ou necrose. Neville, pag. 147, 1º parágrafo.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
43	(C) Linha alba	A linha alba ocorre nas superfícies vestibulares dos dentes nas condições descritas no enunciado da questão. Neville, pag. 287	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
45	(D) Infecção elemento 26	O aumento do volume bucal secundário à infecção associada ao elemento 26 ocorre em posição superior a inserção do músculo bucinador. Peterson et al., pags. 369, 393.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
46	(D) Fórceps para remoção de pré-molares inferiores	O fórceps nº 151A foi ligeiramente modificado para ser usado em pré-molares inferiores. Eles não devem ser utilizados em outros dentes inferiores, porque sua forma não permite adaptação para as raízes. Peterson et al., pág.116.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO

47	(D) Classificação de Ellis	A classe IV de Ellis corresponde ao descrito no comando da questão. Dym, H. Atlas de cirurgia oral, pg.247	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
48	(A) Indicação errada da questão	O fundamento do recurso se refere a outra questão já respondido.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
49	(B) Desgaste dentário	O conceito de erosão vem descrito em Neville, pag 62 e corresponde integralmente ao enunciado descrito na questão.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO
50	(D) Trauma dentoalveolar com deslocamento dentário.	Os períodos de estabilização para os traumas dentoalveolares estão demonstrados na Tabela 23.1, em Peterson et al, pag 555. No caso descrito os autores afirmam ser de 2 a 3 semanas.	<b>INDEFERIDO</b>	GABARITO MANTIDO