

Concurso Público destinado à contratação de empregados e formação de cadastro reserva para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Estatal de Saúde de Maricá – Edital 1/2023

RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL SUPERIOR

Disciplina Língua Portuguesa

Legislação do SUS

Conhecimentos Específicos

EMPREGO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

Nº da Questão	Opção de resposta por extenso conforme escrito na prova	Parecer da Banca	Deferido ou Indeferido	Questão anulada ou Opção de Resposta correta
21	(A) Correspondem a 47% dos papilomas.	De acordo com o Tratado de Otorrinolaringologia 3ª edição (2017), página 2515:” ... os papilomas invertidos correspondem a 47% dos papilomas, sendo com frequência associados ao carcinoma escamoso. As recidivas têm diminuído pós-cirurgia, pois até duas décadas atrás eram de 30%.”	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
23	(B) Metástases linfonodais regionais aparecem em cerca de 10% dos casos.	Questão em desacordo com o previsto no Edital composta por apenas 4 opções.	DEFERIDO	ANULADA

24	(A) O envolvimento laríngeo na artrite reumatoide pode acontecer em 20 a 70% dos pacientes.	De acordo com o Tratado de Otorrinolaringologia 3ª edição (2017), página 3889: "... o envolvimento laríngeo pode acontecer em 20% a 70% dos pacientes. Essa grande variação decorre das diferenças de características da casuística estudada e dos critérios para definir o acometimento: sintomas clínicos, achados laringoscópicos ou anatomopatológicos (<i>post mortem</i>)."	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
28	(A) Na grande maioria destes pacientes o tumor primário é de localização infraclavicular.	Questão em desacordo com o previsto no Edital. A questão apresenta mais de uma opção correta.	DEFERIDO	ANULADA
30	(B) Na quase totalidade dos casos, é o paciente quem "indica" a cirurgia, cabendo ao médico concordar, modificar as expectativas ou contraindicar o procedimento.	De acordo com o Tratado de Otorrinolaringologia 3ª edição (2017), página 5204: "... na quase totalidade dos casos, é o paciente quem 'indica a cirurgia, cabendo ao médico concordar, modificar as expectativas ou contraindicar o procedimento. Quando a causa principal ou única refere-se à função, os cuidados na indicação não diferem muito das outras cirurgias, mas quando a busca inclui motivos estéticos, são necessários cuidado especiais para evitar insatisfações, muitas vezes graves."	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
40	(B) As RAEE podem ser utilizadas para medir informações por frequência específica em níveis de intensidade maiores de 120 dB.	De acordo com o Tratado de Otorrinolaringologia 3ª edição (2017), páginas 359-360, As RAEE podem ser pesquisadas em intensidade de 30 dB acima do PEATE, revelando alta exatidão para caracterizar o grau da perda auditiva em crianças, principalmente nas perdas auditivas neurosensoriais de grau mais severo, da mesma forma em relação às perdas auditivas de grau profundo, mostrando uma correlação de 10 dB em 96% das crianças com perda auditiva de grau profundo; a ausência de resposta é indicativo de perda auditiva com limiar em 115 decibéis (dB) ou mais em 93% das crianças. As RAEE apresentam-se como técnica eficaz para a obtenção de informações sobre a audição residual da criança deficiente auditiva.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

43	(C) Alexander	De acordo com o Manual de Otorrinolaringologia e Cirurgia de cabeça e pescoço 1a edição, página 986: "... é a deformidade de desenvolvimento do labirinto ósseo e membranoso. Ocorre malformação do modíolo e da lâmina espiral óssea, cóclea reduzida, vestibulo alargado e anomalia dos canais semicirculares. Apenas o giro basal da cóclea pode ser identificado. Decorre de parada de desenvolvimento na sétima semana de gestação, quando apenas o giro basal da cóclea está formado. Em 20% dos casos, há malformação dos canais semicirculares. É o tipo mais comum de malformação coclear. Na primeira descrição de Mondini, a cóclea está achatada, apresentando apenas o primeiro giro e metade do segundo, sendo o restante da cóclea uma cavidade única, por causa do não desenvolvimento do modíolo e da lâmina espiral óssea; descreveu também alargamento do ducto endolinfático. Pode ser unilateral. O desenvolvimento do órgão de Corti é variável, assim como a população de neurônios auditivos. A audição é variável, desde normal até perda auditiva profunda."	DEFERIDO	ALTERADO DE C PARA LETRA A
45	(B) A pressão positiva contínua nas vias aéreas superiores é o padrão-ouro de tratamento.	De acordo com o Tratado de Otorrinolaringologia 3a edição (2017), página 5986:" ... a primeira linha de tratamento em SAOS é o uso de aparelhos de CPAP." Página 6382 "...Dessa forma, é considerado a terapia de escolha para a SAOS, em especial dos quadros moderados a graves."	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
46	(C) Malformação de Mondini	De acordo com o Tratado de Otorrinolaringologia 3ª edição (2017), página 630: "... é a mais comum das malformações e encontra-se, quase sempre, associada à presença de aqueduto vestibular alargado." "... Além do aqueduto vestibular dilatado, anomalias na platina do estribo predispõem esse paciente à formação de fístula perilinfática e meningite. A perda auditiva é variável dependendo do labirinto membranoso."	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
49	(A) Com a suspeita de estenose ou obstrução de subglote deve ser realizada avaliação com Radiografia de partes moles do pescoço e	O comando da questão fala em conduta correta. Neste sentido no caso apresentado, na busca do melhor para este paciente (o que a literatura chama de padrão-ouro) a conduta correta é realizar os procedimentos previstos na opção A.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

	laringoscopia direta sob anestesia geral.			
--	--	--	--	--