

Concurso Público destinado à contratação de empregados e formação de cadastro reserva para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Estatal de Saúde de Maricá – Edital 1/2023

RESPOSTAS AOS RECURSOS – Nível Superior

Disciplina Língua Portuguesa

Legislação do SUS

Conhecimentos Específicos

EMPREGO: MÉDICO RADIOLOGISTA

N° da Questão	Opção de resposta por extenso conforme escrito na prova	Parecer da Banca	Deferido ou Indeferido	Questão anulada ou Opção de Resposta correta
21	(A) Sequestro pulmonar intralobar	O Sequestro pulmonar é designado como intra ou extralobar, de acordo com a relação do tecido sequestrado com o pulmão. O Sequestro intra-lobar é uma anomalia em que uma artéria sistêmica, originando-se normalmente da aorta torácica descendente (73%) ou aorta abdominal (20%), estende-se até um tecido pulmonar que não esteja ligado à arvore brônquica normal e recebe, por isso, denominação de sequestrado. Em 98% dos casos o SIL ocorre num lobo pulmonar inferior, geralmente à esquerda. O diagnóstico definitivo depende da exata visualização dos vasos que nutrem e drenam o sequestro, condição essencial para o planejamento cirúrgico. O	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO

		sequestro intralobar é três vezes mais frequente do que a variedade extralobar.		
23	(A) Pneumocistose	Os achados da tomografia do tórax descritos no enunciado da questão são característicos da tuberculose e não são achados usuais da pneumocistose.	DEFERIDO	ALTERADO GABARITO DE A PARA D
24	(C) Sarcoidose pulmonar	Os achados radiológicos descritos sugerem linfangite carcinomatosa, associado com o quadro clínico apresentado.	DEFERIDO	ALTERADO GABARITO DE C PARA D
29	(B) Laceração	Na dissecação aórtica não existe hematoma ao redor da aorta assim como não há extravasamento de contraste. Falsos aneurismas ou pseudoaneurismas da aorta são o resultado da ruptura de pelo menos uma camada da parede aórtica, rodeada e contida pelas restantes paredes da aorta e estruturas mediastínicas adjacentes. No pseudoaneurisma o achado radiológico tem um aspecto de dilatação sacular parietal, o que não foi descrito no enunciado da questão e que não pode ser confundido com hematoma	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO
30	(A) Tuberculose	A pericardite constrictiva pode ocorrer por diversas causas, inclusive por neoplasias e doenças do tecido conectivo. Em países em desenvolvimento, a primeira causa de pericardite constrictiva é a tuberculose.	INDEFERIDO	GABARITO MANTIDO