

RESPOSTAS AOS RECURSOS – Nível Superior

Disciplina ☐ Língua Portuguesa
☐ Noções Básicas da Administração Pública
☒ Conhecimento Específico

Cargo: Médico/Área: DERMATOLOGIA

Nº da Questão	Opção de Resposta por extenso	Parecer da Banca	Deferido ou Indeferido	Questão anulada ou Opção de Resposta correta
44	(C) O tipo superficial é apresentação característica de pacientes submetidos à radioterapia	Não há acordo sobre sua histogênese (do carcinoma basocelular) – Dermatologia de Sampaio e Rivitti, página 1170. Portanto, a opção que afirma categoricamente que a sua histogênese está relacionada às células da camada basal da epiderme está incorreta. Sabe-se, entretanto, que múltiplos fatores são considerados de risco para o desenvolvimento do carcinoma basocelular, dentre os quais as radiações ionizantes – Dermatologia de Sampaio e Rivitti, p.1171. O aparecimento de malignidades primárias da pele no local de radioterapia é esperado e definido como aquelas que surgem, no máximo dois anos após o seu término. O carcinoma basocelular é o tipo mais comum – Azulay Dermatologia, pag.654., cap 51.	Indeferido	GABARITO MANTIDO
49	(A) linfoma cutâneo	Duas opções podem ser consideradas corretas.	Deferido	ANULADA