

JUSTIFICATIVAS DAS RESPOSTAS – EDITAL 14

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

ENFERMAGEM

21 Opção (D)

Resposta correta : O fortalecimento do comércio exterior e aumento das exportações de alimentos.

Justificativa: O estabelecimento concreto de ação articulada entre essas áreas e o setor de meio-ambiente é a questão relacionada ao uso de agrotóxicos, em que estão implicadas a saúde dos trabalhadores, a educação da população local, as relações de trabalho e a própria saúde do consumidor dos alimentos produzidos, além da contaminação ambiental cumulativa dos produtos.

Pág. 13/14 - Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Área Técnica de Saúde do Trabalhador. - Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 63p. : il. - (Cadernos de Atenção Básica. Programa Saúde da Família; 5)

22 Opção (A)

Resposta correta: É neurossensorial, irreversível, geralmente bilateral e simétrica

Justificativa: A perda auditiva induzida pelo ruído, relacionada ao trabalho, é uma diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada a níveis elevados de ruído. Algumas de suas características são:

- é sempre neurossensorial, por causar danos às células do órgão de CORTI;
 - é irreversível e quase sempre similar bilateralmente;
 - é passível de não progressão, uma vez cessada a exposição ao ruído intenso.
- Pág.23 - Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Área Técnica de Saúde do Trabalhador. - Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 63p. : il. - (Cadernos de Atenção Básica. Programa Saúde da Família;

23 Opção (C)

Resposta correta: São classificados quanto aos tipos de organismos que controlam, quanto à toxicidade da(s) substância(s) e quanto ao grupo químico ao qual pertencem.

Justificativa: Agrotóxicos Conhecidos por diversos nomes- praguicidas, pesticidas, agrotóxicos, defensivos agrícolas, venenos, biocidas etc.- esses produtos, em vista de sua toxicidade, provocam grandes danos à saúde humana e ao meio ambiente. Por isso, seu uso deve ser desestimulado, o que é possível a partir da utilização de outras tecnologias, ambientalmente mais saudáveis.

Todo produto agrotóxico é classificado pelo menos quanto a três aspectos: quanto aos tipos de organismos que controlam, quanto à toxicidade da(s) substância(s) e quanto ao grupo químico ao qual pertencem.

Pág.25 - Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Área Técnica de Saúde do Trabalhador. - Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 63p. : il. - (Cadernos de Atenção Básica. Programa Saúde da Família;

24 Opção (D)

Resposta correta: Compete ao SUS realizar ações de assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou doença ocupacional, promover estudos e pesquisas sobre riscos no processo de trabalho e informar trabalhadores, sindicatos e empresas sobre riscos e resultados de avaliações, respeitando a ética.

Justificativa: A Lei Orgânica da Saúde- LOS (Lei n.O 8.080/90), que regulamentou o SUS e suas competências no campo da Saúde do Trabalhador, considerou o trabalho como importante fator determinante/condicionante da saúde. O artigo 6º da LOS determina que a realização das ações de saúde do trabalhador sigam os princípios gerais do SUS e recomenda, especificamente, a assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional ou do trabalho; a realização de estudos, pesquisa, avaliação e controle dos riscos e agravos existentes no processo de trabalho; a informação ao trabalhador, sindicatos e empresas sobre riscos de acidentes bem como resulta dos de fiscalizações, avaliações ambientais, exames admissionais, periódicos e demissionais, respeitada a ética.

Pág.13 - Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Área Técnica de Saúde do Trabalhador. - Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 63p. : il. - (Cadernos de Atenção Básica. Programa Saúde da Família.

25 Opção (B)

Resposta correta: Ficha de Notificação de Acidentes de Trabalho Graves e Doenças Relacionadas ao Trabalho do SINAM.

Justificativa: Assistência à saúde do trabalhador deve desenvolver-se integrada às ações de vigilância epidemiológica e sanitária neste campo, pois, dessa forma, a dinâmica do processo saúde/doença decorrente do trabalho poderá adquirir contornos mais definidos. Havendo informações resumidas, analisadas, interpretadas e divulgadas, pelos níveis de atenção, como fruto de uma atuação integrada assistência/vigilância, certamente o papel atribuído ao sistema de vigilância, que é o de orientar as ações, será cumprido. Em anexo, os instrumentos que deverão ser utilizados nas ações de Saúde do Trabalhador.

Ficha de Notificação de Acidentes de Trabalho Graves e Doenças Relacionadas ao Trabalho do SINAM; Ficha para Registro de Atividades, Procedimentos e Notificações do SIAB, Ficha de Atendimento no Serviço

Pág.33/34 - Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Área Técnica de Saúde do Trabalhador. - Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 63p. : il. - (Cadernos de Atenção Básica. Programa Saúde da Família.

26 Opção (A)

Resposta correta (A): O funcionamento e a operacionalização destes centros devem prever facilidade de acesso da população

Justificativa: A Portaria no 48, de 28 de julho de 2004, institui as diretrizes gerais para o funcionamento dos Cries que estão administrativamente subordinados às instituições onde estão implantados e técnica mente às Secretarias Estaduais de Saúde (SES).

O funcionamento e a operacionalização destes centros devem prever facilidade de acesso da população, em especial dos portadores de imunodeficiência e de condições de morbidade ou exposições às situações de risco e, da mesma forma, garantir investigação, acompanhamento e elucidação dos casos de eventos adversos pós-vacinação.

Pág. 16 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de rede de frio / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 4. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013.

27 Opção (C)

Resposta correta: A exposição de vacinas com adjuvante de alumínio a temperaturas abaixo de +2 °C pode causar perda de potência irreversível

Justificativa: Manter a estabilidade da temperatura das vacinas no armazenamento e transporte e prevenir o congelamento dos imunobiológicos são etapas críticas para assegurar a qualidade dos produtos. As vacinas que contêm adjuvante de alumínio, quando expostas à temperatura abaixo de +20°C, podem ter perda de potência em caráter permanente. O congelamento afeta as vacinas adsorvidas por meio da mudança de sua forma física.

Pág. 36 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de rede de frio / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 4. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013.

28 Opção (B)

Resposta correta: Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CENADI)

Justificativa: A Instância Nacional conta com área física para a estrutura gestora da CGPNI, localizada na Unidade VI do MS – Distrito Federal, além de uma Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de Insumos (Cenadi), localizada no Rio de Janeiro, atualmente, sob a responsabilidade administrativa da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde. A Cenadi é o complexo logístico que representa o nível central da cadeia de frio, possui 17.600 m³ de área refrigerada em temperatura de +20°C a +80°C e 2.646 m³ de área de congelados em temperatura de -200°C , além de 800 m² de área de temperatura controlada entre +160°C a +17°C

para atividades de preparo de recebimento e distribuição. Essa estrutura dispõe de sistema de automação moderno e eficiente para o controle qualificado e manutenção dos equipamentos de refrigeração, alarmes e geração externa de energia.

Pág. 14 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de rede de frio / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 4. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013.

29 Opção (A)

Resposta correta: de modo ativo ou passivo.

Justificativa: A imunidade adquirida específica corresponde à proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno. A resposta específica inicia-se quando os agentes infecciosos são reconhecidos nos órgãos linfoides pelos linfócitos T e B. Os linfócitos B iniciam a produção de anticorpos específicos (imunidade humoral) contra o antígeno. Já os linfócitos T viabilizam a produção de células de memória (imunidade celular).

A imunidade específica pode ser adquirida de modo ativo ou passivo.

Pág. 18/19 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 176 p. : il.

30 Opção (A)

Resposta correta: fator idade

Justificativa: Fatores relacionados ao vacinado Idade No primeiro ano de vida, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Para algumas vacinas, devido à sua composição, é necessária a administração de um número maior de doses, de acordo com a idade, como ocorre com a vacina conjugada pneumocócica 10 valente, a meningocócica C e a vacina hepatite B.

Pág. 21 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 176 p. : il.

31 Opção (D)

Resposta correta: Realizar higienização das mãos antes e após cada procedimento.

Justificativa: A sala de vacinação é classificada como área semicrítica. Deve ser destinada exclusivamente à administração dos imunobiológicos, devendo-se

considerar os diversos calendários de vacinação existentes. Na sala de vacinação, é importante que todos os procedimentos desenvolvidos promovam a máxima segurança, reduzindo o risco de contaminação para os indivíduos vacinados e também para a equipe de vacinação.

Pág. 26 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 176 p. : il.

32 Opção (C)

Resposta correta: A assepsia é definida como a condição de ausência de patógenos produtores de doenças, visando minimizar a ocorrência e disseminação de infecções

Justificativa: Manter as superfícies limpas e desinfetadas, bem como camas, móveis e outros materiais inanimados tocados com frequência, também são favoráveis no controle de infecções. Alguns conceitos básicos são descritos nos itens abaixo. Assepsia: consiste em minimizar o aparecimento e disseminação de infecção. A assepsia é a ausência de patógenos produtores de doenças.

Pág 7 - Manual de Procedimentos Básicos de Enfermagem / Elaboração de André Luiz Thomaz de Souza e Bárbara de Oliveira Prado Sousa. Registro, 2017. 134p; il.

33 Opção (B)

Resposta correta: Podem ser aplicadas na testa e sobre os olhos para aliviar congestão e dor local

Justificativa: As compressas frias geralmente são utilizadas para aplicação na testa e sobre os olhos, para diminuir congestão e dor local; As compressas frias também podem ser utilizadas nas regiões axilares e inguinais para reduzir a temperatura corporal em caso de febre.

Pág 29 - Manual de Procedimentos Básicos de Enfermagem / Elaboração de André Luiz Thomaz de Souza e Bárbara de Oliveira Prado Sousa. Registro, 2017. 134p; il.

34 Opção (D)

Resposta correta: A movimentação e o transporte de pacientes devem ser realizados evitando esforços desnecessários e sempre que possível com auxílio de colegas ou equipamentos adequados

Justificativa: A movimentação e o transporte de paciente é uma atividade comum no serviço de enfermagem. Um fator importante para executar essas atividades, é o emprego de uma boa mecânica corporal pela equipe de enfermagem. Evitar esforços desnecessários é fundamental para prevenir danos ocupacionais e preservar a segurança do paciente.

Pág 33 - Manual de Procedimentos Básicos de Enfermagem / Elaboração de André Luiz Thomaz de Souza e Bárbara de Oliveira Prado Sousa. Registro, 2017. 134p; il.

35 Opção (B)

Resposta correta: O uso inadequado e indiscriminado de antimicrobianos contribui para o aumento da resistência bacteriana

Justificativa: As bactérias, assim como outros microrganismos, possuem alta capacidade de sofrer mutações e adquirir genes de resistência, tornando-se resistentes aos antimicrobianos. O amplo uso de antimicrobianos provoca pressão seletiva de modo que as cepas mais resistentes persistem, propagam-se e acumulam mecanismos de resistência

Pág.11 Manual: Instruções Técnicas da CCIH– Divisão de gestão da qualidade e vigilância em saúde/CCIH – Campina Grande: EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2020

36 Opção (C)

Resposta correta: A fêmea do *Aedes aegypti* costuma picar as pessoas durante o dia, para viabilizar a maturação dos ovos.

Justificativa: A fêmea do *Aedes aegypti* costuma picar as pessoas durante o dia, para viabilizar a maturação dos ovos.

Pág.23 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Atenção Básica . - 2. ed. rev. - Brasília : Ministério da Saúde, 2008. 197 p. : il. - (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica, n. 21)

37 Opção (D)

Resposta correta: O *Mycobacterium leprae*, um bacilo álcool-ácido resistente e gram-positivo, em forma de bastonete.

Justificativa: Pág.66 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Atenção Básica . - 2. ed. rev. - Brasília : Ministério da Saúde, 2008. 197 p. : il. - (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica, n. 21)

38 Opção (B)

Resposta correta: A inalação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de um doente com tuberculose pulmonar é a principal via de transmissão

Justificativa: A tb acomete, prioritariamente, o pulmão que também é a porta de entrada da maioria dos casos. a transmissão se faz por via respiratória, pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de um doente com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea.

Pág. 28 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 364 p. : il.

39 Opção (A)

Resposta correta: deve ser feito a partir de uma ou duas amostras de escarro

Justificativa: O diagnóstico deve ser feito a partir de uma ou duas amostras de escarro. quando na realização de duas amostras, a primeira deve ser coletada no momento da consulta, para aproveitar a presença do doente. Recomenda-se a coleta da segunda amostra no dia seguinte, preferencialmente ao despertar

Pág. 63 - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis.

Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 364 p. : il.

40 Opção (C)

Resposta correta: O homem é considerado a única fonte de infecção, e a principal via de transmissão ocorre pelas vias aéreas superiores, por meio de contato íntimo e prolongado

Justificativa: O homem é considerado a única fonte de infecção da hanseníase. A transmissão se dá por meio de uma pessoa doente (forma infectante da doença - MB), sem tratamento, que elimina o bacilo para o meio exterior infectando outras pessoas suscetíveis. Estima-se que 90% da população tenha defesa natural contra o *M. leprae*, e sabe-se que a susceptibilidade ao *M. leprae* tem influência genética. A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada deste no organismo são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe), através de contato íntimo e prolongado, muito frequente na convivência domiciliar. Por isso, o domicílio é apontado como importante espaço de transmissão da doença. A hanseníase não é de transmissão hereditária (congenita) e também não há evidências de transmissão nas relações sexuais.